



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  
دانشگاه علوم پزشکی و  
خدمات بهداشتی درمانی تبریز  
معاونت درمان

## آموزش بیماران

آنچه نیاز دارید در مورد

Avastin بدانید



مهری گلچین

سوپروایزر آموزشی

مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم  
پزشکی تبریز- بهار ۱۳۸۹

کلیوی، جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته انجام خواهد شد.

ممکن است این دارو برای جنین بسیار مضر باشد. در صورت بارداری و یا تمایل به حاملگی به کادر درمانی اطلاع دهید. بایستی زنان در حین دریافت دارو، از روش های پیشگیری از بارداری مناسبی استفاده نمایند.

هرگونه جراحی اخیر و نیز زخم هایی که بهبود نمی یابند را اطلاع دهید. این دارو حداقل تا ۲۸ روز بعد از اتمام جراحی بزرگ و بهبودی کامل محل عمل جراحی نبایستی تجویز گردد. در صورت نیاز به اعمال داندان پزشکی عمده یا جراحی، مصرف داروی Avastin را اطلاع دهید.

در صورت کمبود دارو با شماره تلفن ۰۹۶۴۶ بدون نیاز به کدگیری در سرتاسر استان و در تمام ایام هفته تماس حاصل کنید.

منبع مورد استفاده:

<http://www.drugdigest.org>

❖ کاهش اشتها

❖ تاخیر در بهبود زخم

❖ اسهال

❖ سردرد

❖ تهوع یا استفراغ

❖ خونریزی بینی

❖ راش پوستی

❖ خستگی/ضعف

### ۶. هنگام دریافت Avastin چه مواردی

#### را بایستی کنترل نمایم؟

در طی تزریق دارو ممکن است تغییراتی در تنفس، تب، لرز، سرگیجه، یا احساس سبکی سر داشته باشید. در صورت بروز به پزشک یا کادر درمانی اطلاع دهید.

در طی دریافت دارو فشار خون شما بایستی هر ۲-۳ هفته کنترل گردد. ممکن است دچار افزایش فشار خون شوید. در صورتی که فشار خون داشته باشید ممکن است فشار خون شما بالاتر نیز برود. بایستی این موارد را گزارش نمایید و بدون اطلاع پزشک اقدام به قطع دارو ننمایید.

بایستی در طی دریافت دارو مایعات فراوان بنوشید تا عوارض احتمالی کلیوی کاهش یابد.

آزمایش تجزیه ادراری در طی دریافت دارو را انجام دهید. در صورت بروز عوارض جانبی

**مقدمه:** این پمفلت حاوی اطلاعات مفیدی در مورد Avastin است که می تواند برای شما مفید باشد. این پمفلت را همیشه دم دست داشته باشید تا در موارد لزوم به آن مراجعه نمایید.

## ۱. Avastin چیست ؟

نام دیگر آن Bevacizumab می باشد. نوعی آنتی بادی مونوکلونال می باشد. آنتی بادی مونوکلونال پروتئینی می باشد که با محل خاص و یا پروتئین خاص واکنش انجام می دهد. این دارو پروتئینی بنام VEGE ( فاکتور رشد آندوتلیال عروقی ) را مورد هدف قرار می دهد. این پروتئین در بسیاری از انواع سلول توموری یافت می شود. این دارو از طریق ممانعت با سلول های توموری، عمل نموده و از انتشار آنها به محل های جدید، ممانعت به عمل می آورد. در درمان انواع مختلف تومورها مانند سرطان های روده و کلیه مورد استفاده قرار می گیرد.

## ۲. قبل از استفاده از Avastin بایستی چه

### مواردی را مد نظر قرار دهید؟

وجود هر کدام از موارد زیر را اطلاع دهید:

- لخته شدن خون
- سرفه خونی و یا وجود خون در خلط
- بیماری قلبی مانند نارسایی قلبی، حمله قلبی، درد قفسه سینه،
- فشار خون بالا

• جراحی اخیر خصوصا

• بیماری های کلیوی

• شیمی درمانی قبلی با داکسوروبیسیکسین،  
دائونوروبیسیکسین، اپی رویسیکسین یا سایر  
داروهای شیمی درمانی گروه آنتراسیکلین  
ها

• رادیوتراپی قبلی قفسه سینه

• واکنش های غیر شایع به Avastin و

سایر داروها، غذاها، رنگ ها و یا

نگهدارنده های غذایی

• بارداری و دوران شیردهی

## ۳. Avastin چگونه تجویز می گردد؟

این دارو توسط پرسنل آموزش دیده و در بیمارستان و یا مطب پزشکان بصورت تزریق داخل وریدی مورد استفاده قرار می گیرد. دوزهای دارویی تجویز شده بایستی بصورت دوزهای دارویی منظم و معمولا هر ۱۴ روز دریافت می گردند.

⚠مصرف سایر داروها مانند داروهای بدون نسخه پزشک، مکمل های تغذیه ای و یا سایر فراورده های گیاهی را به پزشک یا کادر درمانی اطلاع دهید. مصرف زیاد کافئین یا الکل، سیگار و سایر داروهای غیر مجاز را اطلاع دهید. این داروها ممکن است عملکرد Avastin را مختل نمایند. مصرف و یا قطع مصرف هر کدام از داروها را اطلاع دهید.

## ۴. عوارض جانبی :

عوارض جانبی دارو عمدتا به دوز دارویی، مصرف توام سایر داروهای شیمی درمانی و رادیوتراپی انجام شده و وضعیت سلامت حین درمان بستگی دارد. در تمام بیماران این عوارض همگی رخ نمی دهند. در مورد خطرات و فواید درمان، از پزشک سوال نمایید.

عوارض جانبی که بایستی به پزشک یا پرسنل درمانی بلافاصله گزارش نمایید:

❖ وجود خون در مدفوع

❖ افزایش دفعات ادرار

❖ زخم های دهانی

❖ درد شدید شکمی

❖ تورم پاها یا زانوها ، تنگی نفس

❖ نشانه های سکتة مانند تغییر سطح هوشیاری ذهنی،  
عدم توانایی صحبت کردن و حرکت دادن یک  
طرف بدن( خصوصا در بیماران سرطان ریه)

عوارض جانبی که نیازمند توجهات پزشکی خاصی  
نیستند:

( در صورت تداوم عوارض و یا ایجاد ناراحتی به  
پزشک و یا کادر درمانی مراجعه نمایید)

❖ درد شکم

❖ یبوست