



۲۵ درجه سانتی گراد قرار داده نشود. از نور آفتاب محافظت گردد.

بایستی محلول بعد از آماده سازی، در دمای اتاق بمدت ۸ ساعت و در دمای یخچال بمدت ۲۴ ساعت مورد استفاده قرار گیرد.

Reference: Brochure ,Bristol-Myers Squibb.

■ برخی بیماران دچار سردرد، کاهش وزن کاهش اشتها، سوء هضم، تهوع، درد معده، اسهال و استفراغ، ضربان قلب نامنظم، درد مفاصل و عضلات، درد محل تزریق و التهاب ورید ها می گردند. بصورت ناشایع بیماران ممکن است دچار شنیدن صدای زنگ در گوش یا کاهش شنوایی، تاری دید و یا دوبینی، احساس گیجی، تعریق، ضعف، سرگیجه گذرا، اشکال در دفع ادرار، وجود خون در مدفوع، بیحسی انگشتان، گزگز دست ها و پاها و فلاشینگ صورت گردند. اختلالات خونی نیز بصورت تب یا لرز، زخم های گلو و دهان، خستگی و ضعف شدید، خونریزی غیر عادی و کبودی غیر منتظره مشاهده می شود. در صورت وجود هرکدام از این علائم و نشانه ها، بلافاصله آنها را به پزشک اطلاع دهید.

۵. نحوه نگهداری:

تاریخ انقضا : نباید بعد از انقضای تاریخ مصرف، دارو مورد استفاده قرار گیرد.

احتیاطات خاص نگهداری: دارو دور از دسترس کودکان قرار گیرد. در دمای بالاتر از

آموزش بیماران

آنچه نیاز دارید در

مورد **"Fungizone"**

آمفوتریسین " بدانید؟



مهری گلچین

سوپروایزر آموزشی

مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم

پزشکی تبریز

بهار ۱۳۸۷

مقدمه: این پمفلت حاوی اطلاعات مفیدی در مورد **Fungizone** است که می تواند برای شما مفید باشد. این کتابچه را همیشه دم دست داشته باشید تا در موارد لزوم به آن مراجعه نمایید.

۱. Fungizone چیست و در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟

عناصر فعال در **Fungizone** حاوی آمفوتریسین می باشد که به صورت ویال ۵۰ میلی گرم (50000 IU) جهت تزریق وریدی می باشد. این دارو جزء دسته ای از داروها تحت عنوان آنتی بیوتیک های ضد قارچ می باشد.

۲. چرا Fungizone تجویز شده است؟
معمولا این دارو برای درمان عفونت های شدید ناشی از مخمر ها و قارچ ها بکار می رود.

۳. مواردی که Fungizone نبایستی استفاده گردد؟

در موارد زیر نبایستی از این دارو استفاده گردد:

- سابقه قبلی واکنش های آلرژیک (حساسیت) شدید به این دارو

- وجود هر گونه بیماری کبدی و عدم کارکرد صحیح کلیوی

۴. در صورت بارداری و یا تمایل به حاملگی آیا می توان از این دارو استفاده نمود؟

بایستی با پزشک خود صحبت نمایید.

۵. آیا می توانم داروهای دیگری هم دریافت نمایم؟

مصرف سایر دارو ها را حتما به پزشک اطلاع دهید. این داروها شامل شل کننده های عضلانی ، داروهای ضد سرطان، دیگوکسین، استروئید ها و سایر داروهای بدون نسخه که توسط بیمار مصرف می شود، می باشد.

۶. دوز مصرفی دارو چیست و چه موقع داده می شود؟

دوز روزانه مصرفی ۱- ۰/۲۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن می باشد. بایستی دارو در ابتدا آرام و بصورت تزریق وریدی و در عرض چند ساعت تزریق گردد. قبل از شروع درمان "تست دارو" انجام می گیرد. برای برطرف

شدن کامل عفونت، دارو بمدت چندین ماه تجویز می گردد.

۷. آیا نیاز هست تا داروهای دیگری را به همراه این دارو مصرف نمایم؟

در اغلب موارد، پزشک داروهای ضد تهوع و استفراغ یا آسپیرین، آنتی هیستامین، استروئید یا داروی ضد انعقاد برای کمک به رفع عوارض جانبی ناشی از درمان تجویز می نماید.

عوارض جانبی ناخواسته دارو چیست ؟

این دارو بر سلول های خونی، کلیه ها، کبد یا قلب تاثیر می گذارد. به این دلیل، پزشک قبل، حین و بعد درمان آزمایشات و تست های تشخیصی مربوطه را انجام خواهد داد. در تعداد کمی از بیماران، این دارو ممکن است موجب بروز واکنش های حساسیتی با افزایش درجه حرارت بدن ، لرز، تشنج، بشورات پوستی و یا خارش گردد. چون این واکنش های حساسیتی در اغلب موارد در طی دقایق اولیه تزریق دارو، رخ می دهد لذا بایستی بیمار تحت توجهات دقیق پزشکی قرار داشته باشد.