




## آموزش بیماران

### آنچه نیاز دارید در مورد

### Oxaliplatin (الوگزاتین) بدانید؟



### مهری گلچین

### سوپروایزر آموزشی

مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم

پزشکی تبریز

بهار ۱۳۸۷

## ۱۰. چه داروهایی بر الوگزاتین اثر می گذارند:

در طی دریافت این دارو به هیچ عنوان از هیچ واکسن زنده ای استفاده ننمایید. دریافت واکسن زنده در طی درمان، خطرناک می باشد.

برخی داروها نیز می توانند با الوگزاتین تداخل نمایند. قبل از مصرف هرگونه دارو به پزشک اطلاع دهید مانند داروهای بدون نسخه و داروهای گیاهی و.....

## ۱۱. نحوه نگهداری:

**تاریخ انقضا:** نباید بعد از انقضای تاریخ مصرف، دارو مورد استفاده قرار گیرد.

احتیاطات خاص نگهداری: دارو دور از دسترس کودکان قرار گیرد. در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود. از نور آفتاب محافظت گردد.

محللول بعد از رقیق سازی جهت تزریق وریدی در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد بمدت ۲۴ ساعت قابل نگهداری است.

### References:

1. Eloxatin Brochure Sanofi-

Synthelabo.

2. <http://healthy.yahoo.com>.

لرز، نشانه های عفونت مانند قرمزی یا تورم ناحیه تزریق، درد یا تورم، زخم گلو، درد در هنگام ادرار کردن

- استفراغ
- کم آبی بدن: خستگی، تشنگی، دهان خشک، گیجی، سرگیجه و کاهش دفع ادرار
- نشانه های صدمه عصبی مانند: حساسیت زیاد به سرما و وسایل سرد، اشکال در بلع، تنفس و گفتار، درد آرواره، فشار قفسه سینه، درد، سوزن سوزن شدن و سوزش، احساس فرو رفتن سوزن یا بی حسی در دست ها، پاها، اطراف دهان یا گلو

▪ تورم دست ها و پاها

• سایر علائم جانبی که خطرناک نیستند و شما می توانید دریافت دارو را ادامه داده و به پزشک مراجعه نمایید:

- سرفه خشک یا کوتاهی تنفس و یا اشکال در تنفس.
  - اسهال خفیف تا متوسط، تهوع، استفراغ، درد شکم یا از دست دادن اشتها
  - زخم دهان یا گلو
  - درد پشت
- سایر عوارض جانبی نیز ممکن است گزارش شوند. در این صورت آن ها را با پزشک و کادر درمانی مطرح نمایید.

**مقدمه:** این پمفلت حاوی اطلاعات مفیدی در مورد الوگزاتین است که می تواند برای شما مفید باشد. آن را همیشه دم دست داشته باشید تا در موارد لزوم به آن مراجعه نمایید.

## ۱. الوگزاتین چیست و در چه مواردی مورد استفاده قرار می گیرد؟

این دارو جزء دسته ای از داروها تحت عنوان داروهای ضد سرطان می باشد که از رشد سلول های سرطانی ممانعت نموده و رشد و انتشار سلول های سرطانی را در بدن کند می کند. بصورت ویال های ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم است

## ۲. چرا الوگزاتین تجویز شده است؟

این دارو برای درمان سرطان کولون یا رکتوم (روده بزرگ) و اغلب همراه با سایر داروهای ضد سرطان مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو ممکن است برای سایر اهداف درمانی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

## ۳. مواردی که الوگزاتین نبایستی

### استفاده گردد؟

• در موارد زیر نبایستی از این دارو استفاده گردد:

- عفونت، سوء تغذیه
- سابقه قبلی واکنش های آلرژیک (حساسیت) به سیس پلاتین و کاربوپلاتین
- نارسایی مغز استخوان
- بیماری کلیوی
- سابقه درمان با سایر داروهای شیمی درمانی



در صورت بارداری و شیردهی حتما به پزشک اطلاع دهید.

## ۴. احتیاطات خاص:

• از قرار گرفتن در معرض هوای سرد اجتناب نمایید در غیر اینصورت از لباس های مناسب استفاده نمایید. روش های زیر می توانند اثرات ناشی از هوای سرد را کاهش دهید:

• انجام ندادن تنفس عمیق

• به هیچ عنوان بدون دستکش از یخچال یا فریزر چیزی بردارید.

• درجه کولر ماشین و یا در منزل را بالا نبرید.

• آب سرد استفاده ننموده و از ریختن قطعات یخ داخل آب و نوشابه اجتناب نمایید.

• از استفاده از کیسه آب یخ و پد های یخ بر روی بدن خود اجتناب نمایید.

• برای کاهش تهوع و زخم های دهانی از قطعات یخ استفاده ننمایید.

• با کاهش فعالیت سیستم ایمنی بدن، فرد مستعد بروز عفونت می گردد. در طی درمان، از تماس با افراد دچار سرماخوردگی، آنفلونزا و سایر بیماری های عفونی و نیز واکسیناسیون با گونه های زنده ویروس (مانند واکسن فلج اطفال) اجتناب نمایید. همچنین از تماس با افرادی که اخیرا واکسیناسیون با واکسن زنده شده اند، خودداری گردد.

## ۵. الوگزاتین چگونه مورد استفاده قرار

### می گیرد؟

این دارو از طریق تزریق وریدی تجویز می گردد. تزریق دارو در بیمارستان و در طی ۲ الی ۶ ساعت صورت می گردد. مقدار داروی دریافتی و طول مدت درمان توسط پزشک تعیین می گردد. بسته به پروتکل درمانی، شما دارو را هر ۲ هفته یکبار دریافت خواهید نمود.

## ۶. در صورت فراموش کردن دوز مصرفی

### چه بایستی کرد؟

به پزشک اطلاع دهید.

## ۷. در صورت مصرف بیش از حد دارو چه

### بایستی کرد؟

توجهات پزشکی اورژانسی مورد نیاز می باشد و بلافاصله بایستی اقدامات لازم انجام گیرد.

## ۸. عوارض جانبی:

در صورت بروز هر کدام از عوارض جانبی جدی زیر بلافاصله به پزشک مراجعه نمایید:

- اسهال، حرکات زیاد روده ای یا مدفوع آبکی
- واکنش آلرژیک (اشکال در تنفس، سرفه
- ناگهانی، گرفتگی گلو، تورم لب ها، زبان و صورت، جوش های پوستی
- تضعیف سیستم ایمنی: خستگی، کبودی، خونریزی، مدفوع سیاه، قیری و خونی، تب و