

## طریقه نمره بندی (Score) فلبيت

در تمام بیماران دارای کانولاسیون عروقی بایستی روزانه محل تزریق از نظر نشانه های فلبيت کنترل گردد. همچنین بایستی محل کانولاسیون وریدی از نظر موارد زیر مورد مشاهده قرار گیرد: تزریق بولوس - تعویض ظروف حاوی محلول انفوزیون - تغییر سرعت جریان مایع

### شرایط نمره بندی فلبيت

محل تزریق سالم بنظر می رسد	0	علامه فلبيت وجود ندارد محل کانولا مورد مشاهده قرار گیرد
یکی از نشانه های زیر وجود دارد: ⊗ درد مختصر در نزدیکی محل تزریق ⊗ سرخی مختصر در نزدیکی محل تزریق	1	علامه اولیه احتمالی فلبيت وجود دارد محل کانولا مورد مشاهده قرار گیرد
دو تا از نشانه های زیر وجود دارد: ⊗ درد محل تزریق ⊗ اریتم ⊗ تورم	2	مرحله (Stage) اولیه فلبيت تعویض محل کانولا
تمام نشانه های زیر وجود دارد: ⊗ درد تمام مسیر کانولا ⊗ سرخی ⊗ سفتی محل تزریق	3	مرحله (Stage) متوسط فلبيت تعویض محل کانولا شروع درمان فلبيت
وجود تمام نشانه های زیر کاملا مشهود است: ⊗ درد تمام مسیر کانولا ⊗ سرخی ⊗ سفتی محل تزریق ⊗ لمس ورید به حالت سفت و طنابی	4	مرحله (Stage) پیشرفته فلبيت یا مرحله ترومبوفلبيت تعویض محل کانولا شروع درمان فلبيت
وجود تمام نشانه های زیر کاملا مشهود است: ⊗ درد تمام مسیر کانولا ⊗ سرخی ⊗ سفتی محل تزریق ⊗ لمس ورید به حالت سفت و طنابی ⊗ تب	5	مرحله (Stage) پیشرفته ترومبوفلبيت شروع درمان فوری فلبيت تعویض محل کانولا