



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی تبریز
معاونت درمان

آموزش بیماران

آنچه نیاز دارید در مورد
میتومایسین بدانید



فریبا کاظمی اسکنданی

سرپرستار بخش خون و انکولوژی
مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز- بهار ۱۳۸۹

کوفنگی، مدفوع قیری و خون در ادار را به پزشک اطلاع دهید. در صورت خونریزی غیر عادی به پزشک خبر دهید و مراقب باشد تا خراش و بریدگی در شما اتفاق نیفتد.

- از مصرف آسپرین، استامینوفن، ایبوپروفن، ناپروکسن و کتوپروفن یا هر دارویی که تب را مخفی می کند پرهیز کنید.
- در صورت جراحی و یا اعمال دندانپزشکی دریافت میتومایسین را به پزشک اطلاع دهید.
- با احتیاط مسوک (مسواک نرم) بزنید. در صورت مراجعت به دندانپزشک مصرف دارو را اطلاع دهید.

در صورت کمبود دارو، با شماره تلفن ۰۹۶۴۶ بدون نیاز به کد گیری در سرتاسر استان و در تمام ایام هفته تماس حاصل کنید.

منبع مورد استفاده:

<http://www.drugdigest.org>

اسهال

- آبی یا سبز شدن رنگ ادار
- خستگی
- بی قراری
- کاهش اشتها
- بی رنگ شدن ناخن
- تهوع استفراغ
- زخم های دهانی
- ضعف

چه اقداماتی را باید حین دریافت دارو انجام دهید؟

- باید برای کترل سیر بیماری و انجام منظم آزمایشات خونی به پزشک مراجعه کنید.
- بدون دستور پزشک قطع نکنید. ممکن است چند روز یا چند هفته بعد از دریافت میتومایسین، احساس ضعف و بیقراری کنید.
- حین دریافت دارو ممکن است، توانایی بدن برای مقابله با عفونت کاهش یابد. در صورت بروز تب، لرز، سرفه، زخم گلو و دیگر نشانه های سرماخوردگی به پزشک اطلاع دهید. هرگز خوددرمانی نکنید. از افراد بیمار (سرما خورده و.....) دوری کنید. جوش های ته سنجاقی قرمز،

عوارضی که باید در صورت بروز هر چه سریعتر به پزشک اطلاع دهد.
عبارتند از:

- کاهش سلول های خونی (میتومایسین ممکن است تعداد گلبول های سفید، گلبول های قرمز و پلاکت ها را کاهش دهد). خطر عفونت و خونریزی ممکن است افزایش یابد.
- نشانه های عفونت (تب، لرز، سرفه، زخم گلو و سوزش ادرار)
- علائم کاهش پلاکت (جوش های ته سنjacی قرمز، کوفتگی، مدفوع قیری و خون در ادرار) و علائم کاهش گلبول های قرمز (خستگی و ضعف غیرعادی، سنکوب، سبکی سر)
- سرفه های خشک و خونی، کوتاهی تنفس
- درد، تورم، قرمزی، تحریک محل تزریق

عوارض جانبی که نیاز به توجه خاص پزشکی ندارند و فقط در صورت ادامه پزشک را مطلع کنید:

- خستگی
- ریزش مو
- گیجی
- اسهال
- آبی یا سبز شدن رنگ ادرار

چه داروهایی با میتومایسین تداخل می کنند:

- سایر داروهای شیمی درمانی ممکن است عوارض دارو را افزایش دهند.
- واکسن ها
- وین بلاستین، وینکریستین و وینورلین

قبل از مصرف داروهای زیر با پزشک صحبت کنید:

- آسپرین - استامینوفن - ایبوپروفن - ناپروکسن
- کنپپروفن
- در مورد داروهایی که استفاده می کنید بویژه داروهایی که خودسرانه مصرف می کنید با تیم بهداشتی صحبت کنید. چنانچه سیگاری یا الکلی هستید و یا کافئین زیاد مصرف می کنید به تیم بهداشتی اطلاع دهید. این داروها ممکن است در عملکرد دارو اثر کنند. قبل از شروع یا قطع آنها با پزشک مشورت کنید.

عوارض جانبی که باید حین دریافت میتومایسین به آن توجه کنید:

عوارض جانبی ناشی از میتومایسین بستگی به دوز دارو، روش تزریق و پرتو درمانی و بیماری زمینه ای دارد. عوارض زیر در تمام بیماران بروز نمی کند.

میتومایسین: میتومایسین داروی شیمی درمانی است که برای درمان انواع سرطان ها استفاده می شود. این دارو تقسیم سریع سلول های سرطانی را مهار نموده و موجب مرگ سلولی می شود. میتومایسین به تنها یی یا به همراه دیگر داروهای شیمی درمانی و پرتو درمانی به کار می رود. حین دریافت دارو چه موادی را باید به تیم بهداشتی

اطلاع دهید؟

1. عفونت فعال
2. کم خونی
3. اختلالات خونی
4. بیماری کلیوی
5. رادیوتراپی اخیر
6. هرگونه واکنش حساسیتی به میتومایسین، سایر داروهای شیمی درمانی و غذاهای حاملگی یا تصمیم به حامله شدن
7. شیردهی

چگونه باید این دارو را دریافت کنید؟

میتومایسین به صورت تزریق داخل وریدی تجویز می شود. دارو در بیمارستان یا درمانگاه توسط افراد آموزش دیده و متخصص تزریق می شود. شما باید برنامه درمانی را به طور منظم ادامه دهید. دارو معمولاً هر ۴ هفته تکرار می شود.